

AVINEW

Vacuna viva contra la enfermedad de Newcastle

**en liofilizado para suspensión para administración oral,
ocular y para pulverización**

Laboratorio

MERIAL LABORATORIOS, S.A.

Forma farmacéutica

Liofilizado para suspensión para administración oral y ocular y para pulverización
(Liof.Susp.o.oc.pulv.)

Composición por dosis:

Virus vivo de la enfermedad de Newcastle, cepa VG/GA, $\geq 10^{5.5}$ DIE₅₀/ds. Excipiente de liofilización c.s.p. 1ds.

DIE₅₀: Dosis infecciosa en huevo al 50 por ciento.

Propiedades farmacológicas

La cepa VG/GA es lentogénica y naturalmente apatógena para las aves. La vacuna induce una inmunización activa contra la enfermedad de Newcastle, demostrado por la prueba de desafío en pollos de engorde.

Interacciones e incompatibilidades

- La presencia de desinfectantes y/o antisépticos en el agua y en el material usado para la preparación de la solución de la vacuna es incompatible con una vacunación eficaz.
- No mezclar con otros productos.

Indicaciones y especies de destino

Inmunización activa de pollos a partir del primer día de edad contra la enfermedad de Newcastle, para reducir la mortalidad y los signos clínicos asociados a la enfermedad.

Inicio de la inmunidad: 14 días después de la primovacunación. *Duración de la inmunidad inducida por la pauta vacunal:* Protección hasta la edad de 6 semanas.

En pollitas futuras ponedoras y futuras reproductoras, a partir de 4 semanas de edad: Preparación para la inmunización activa contra la caída de puesta causada por la enfermedad de Newcastle antes de la vacunación con una vacuna inactivada (cepa Ulster 2C) antes del inicio de la puesta.

Vía de administración

En pollos de engorde y pollitas futuras ponedoras y reproductoras: Vía ocular (gota en ojo), vía oculonasal (pulverización gruesa), vía oral (agua de bebida).

Posología

Pollos de engorde:

Primovacunación: Por vía ocular (gota en ojo) u oculonasal (pulverización gruesa), a partir del primer día de edad.

Revacunación: Por vía oral (agua de bebida) a la edad de 3 semanas.

Pollitas futuras ponedoras y futuras reproductoras:

- Dos administraciones por vía ocular (gota en el ojo), vía oculonasal (pulverización gruesa) o vía oral (agua de bebida): A la edad de 4 y 8 semanas la vacunación con el producto debe ser seguida por la vacunación con una vacuna inactivada (cepa Ulster 2C) antes del inicio de la puesta.
- Reconstituir y preparar la vacuna utilizando agua fresca y limpia.
- Para la preparación y administración de la vacuna, usar material estéril libre de desinfectantes y/o antisépticos.
- Agitar la solución de vacuna reconstituida antes de su uso.

Precauciones especiales

- No vacunar animales enfermos.
- Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las normativas locales.

Tiempo de espera

0 días.

Modo de conservación

Conservar entre 2 y 8 °C, protegida de la luz.

Observaciones

Con prescripción veterinaria.

Presentación

Envases con 10 frascos de 2000 dosis.

Reg. Nº

1438 ESP