

DIFTOSEC CT

Vacuna viva viruela aviar en suspensión inyectable

Laboratorio

MERIAL LABORATORIOS, S.A.

Forma farmacéutica

Polvo y disolvente para suspensión inyectable (Polv.d.susp.i.)

Composición por ml:

Virus atenuado de la viruela aviar cepa DCEP25 ≥ 1000 DICC₅₀, excipiente c.s.p. 1 dosis.

Propiedades farmacológicas

La vacuna protege a las gallinas y los pavos contra la viruela aviar.

Indicaciones y especies de destino

Pollos de engorde, Pollitas futuras ponedoras, Futuras reproductoras y Pavos: Inmunización activa contra la viruela aviar.

Vía de administración

Administrar por punción en la membrana del ala de los pollos y pollitas futuras reproductoras y ponedoras o por escarificación en la cara externa del muslo en los pavos.

Posología

1 dosis (0,01 ml) cualquiera que sea la edad del animal, según la pauta de vacunación siguiente:
En medio sano: Vacunación a partir de las 4 semanas de edad y revacunación anual para los animales que se mantengan más allá de las 18 semanas de edad.
En medio contaminado: Vacunación a partir de las 4 semanas de edad y revacunación 3 meses después seguida de revacunación anual para los animales que se mantengan más allá de las 18 semanas de edad.

Precauciones especiales

- Reconstituir la vacuna liofilizada con su disolvente.
- Agitar la suspensión de vacuna reconstituida, antes de su empleo.
- No vacunar más que a los animales en buen estado de salud, a partir de las 4 semanas de edad.
- En caso de inyección accidental de una persona, consultar inmediatamente con un médico.

Tiempo de espera

0 días.

Modo de conservación

Conservar entre 2 y 8 °C, protegida de la luz.

Observaciones

Con prescripción veterinaria.

Presentación

Caja de 5 frascos de 1000 dosis.

Reg. Nº

9323 IMP