

EURICAN[®] L

Vacuna inactivada leptospirosis por *Leptospira interrogans* serovariedad *canicola* y *Leptospira interrogans* serovariedad *icterohaemorrhagiae* en suspensión inyectable

Laboratorio

MERIAL LABORATORIOS, S.A.

Forma farmacéutica

Suspensión inyectable (Susp.i.)

Composición por dosis:

Leptospira interrogans serovariedad *canicola* (cepa 16070) inactivada, protección >80%*;
Leptospira interrogans serovariedad *icterohaemorrhagiae* (cepa 160601), protección >80%*.
*Según el ensayo de potencia en hámsteres de la Farmacopea Europea.

Propiedades farmacológicas

Vacuna inactivada de las leptospirosis por *Leptospira interrogans* serovariedades *canicola* e *icterohaemorrhagiae* del perro.

La vacuna induce inmunidad activa contra las leptospirosis por *Leptospira interrogans* serovariedades *canicola* e *icterohaemorrhagiae* del perro.

Indicaciones y especies de destino

Perro: Inmunización activa contra leptospirosis por *Leptospira interrogans*, serovariedad *canicola* y *Leptospira interrogans* serovariedad *icterohaemorrhagiae*.

• La duración de la inmunidad conferida por la pauta vacunal propuesta es de 1 año.

Inicio de la inmunidad: 2 semanas después de la vacunación.

Contraindicaciones

Ninguna.

Efectos secundarios

Excepcionalmente, la vacunación puede poner de manifiesto un estado de hipersensibilidad. Entonces, hay que instaurar un tratamiento sintomático.

Vía de administración

Subcutánea o intramuscular.

Posología

Perros: 1 dosis de 1 ml según la pauta de vacunación siguiente:

Primovacunación:

- 1ª inyección: A partir de la 7ª semana de vida.
- 2ª inyección: 3 a 5 semanas después, a partir de las 12 semanas de edad.

Revacunación: Anual. En caso de riesgo epidemiológico importante, la revacunación puede hacerse semestralmente.

Precauciones especiales

- Vacunar únicamente animales en buen estado de salud y correctamente desparasitados.
- Se recomienda no someter al perro a esfuerzos físicos importantes durante el periodo de instauración de la inmunidad.
- Utilizar para la inyección material estéril y desprovisto de cualquier traza de antiséptico y/o desinfectante.
- La vacuna puede utilizarse durante la gestación y la lactancia.
- En caso de autoinyección accidental de la vacuna, consultar inmediatamente con un médico.

Tiempo de espera

No precisa.

Modo de conservación

Conservar entre 2 y 8 °C, protegida de la luz. No congelar.

Observaciones

Con prescripción veterinaria.

Presentación

Caja de 10 viales de 1 ml.

Reg. N°

8238 IMP