

EURICAN[®] MHP-L

**Vacuna viva contra el moquillo, hepatitis y parvovirus,
y vacuna inactivada frente a la leptospirosis canina
en liofilizado inyectable**

Laboratorio

MERIAL LABORATORIOS

Forma farmacéutica

Liofilizado y disolvente para suspensión inyectable (Liof.dis.susp.i.)

Composición por dosis (1 ml):

Fracción liofilizada: Adenovirus canino tipo 2 vivo atenuado (cepa CAV2-DK13), mínimo $10^{2.5}$ DICC₅₀; virus vivo del moquillo atenuado (cepa BA), mínimo 10^3 DICC₅₀; parvovirus canino atenuado (cepa Cornell), mínimo 10^3 DICC₅₀.

Fracción líquida: *Leptospira interrogans* serovariedad *canicola* inactivada >80 % protección*;

Leptospira interrogans serovariedad *icterohaemorrhagiae* inactivada >80 % protección*.

*De acuerdo con el ensayo de potencia en hámster de la Farmacopea Europea.

Propiedades farmacológicas

Inmunización activa del perro frente al moquillo, hepatitis, laringotraqueítis, leptospirosis y parvovirus.

Interacciones e incompatibilidades

No mezclar con ninguna otra vacuna o producto inmunológico.

Indicaciones y especies de destino

Perro: Inmunización activa de los perros frente al virus del moquillo, adenovirus tipo 2, el parvovirus canino y las leptospirosis caninas causadas por *Leptospira interrogans*, serovariedades *canicola* e *icterohaemorrhagiae*.

• La duración de la inmunidad conferida por la pauta vacunal propuesta es de 1 año.

Inicio de la inmunidad: 2 semanas después de la primovacunación.

Efectos secundarios

Excepcionalmente la vacunación puede poner de manifiesto un estado de hipersensibilidad. Instaurar entonces un tratamiento sintomático.

Vía de administración

Intramuscular o subcutánea.

Posología

Perros: 1 dosis (1 ml)/perro, cualquiera que sea su edad, raza y peso, según las modalidades siguientes:

Primovacunación:

- Primera inyección a partir de la 7ª semana de edad.
- Segunda inyección, 3 a 5 semanas más tarde, pero nunca antes de las 12 semanas de edad.

Revacunación: Una dosis anual.

Precauciones especiales

- Utilizar la vacuna inmediatamente después de la reconstitución del liofilizado con el disolvente.
- Sólo vacunar animales en perfecto estado de salud y correctamente desparasitados.
- Utilizar para la inyección, material estéril sin ninguna traza de antiséptico.
- Respetar las condiciones habituales de asepsia.
- Se recomienda no someter al perro a esfuerzos físicos importantes durante el periodo de instauración de la inmunidad.
- La vacuna puede utilizarse durante la gestación y la lactancia.

Tiempo de espera

No procede.

Modo de conservación

Conservar entre 2 y 8 °C, en la oscuridad. No congelar.

Presentación

Caja de 10 viales de 1 dosis de liofilizado y 10 viales de 1 dosis de disolvente.

Reg. Nº

8841 IMP