

EURICAN[®] MHP-LR

Vacuna asociada contra moquillo, adenovirus tipo 2, parvovirus, leptospirosis y rabia en perros

Laboratorio

MERIAL LABORATORIOS, S.A.

Forma farmacéutica

Liofilizado y disolvente para suspensión inyectable (Liof.dis.susp.i.)

Composición por dosis:

Fracción liofilizada: Adenovirus vivo (cepa CAV2-DK13) $10^{2.5}$ DICC₅₀; virus vivo del moquillo (cepa BA), mínimo 10^3 DICC₅₀; virus vivo de la parvovirus canina (cepa Canell) 10^3 DICC₅₀.

Fracción líquida: *Leptospira interrogans* serovariedad *canicola* inactivada (cepa LI84) >80% protección; *Leptospira interrogans* serovariedad *icterohaemorrhagiae* inactivada (cepa G52) >80% protección; virus inactivado de la rabia (cepa G52), mínimo 1 UI; excipiente, con hidróxido de aluminio, c.s.p. 1 ml.

Propiedades farmacológicas

La vacuna induce una inmunidad activa contra el virus del moquillo, las adenovirus tipo 2, las parvovirus, las leptospirosis por *Leptospira canicola* y *Leptospira icterohaemorrhagiae* y la rabia del perro, demostrado por desafío virulento y por la presencia de anticuerpos seroneutralizantes o aglutinantes.

Indicaciones y especies de destino

Perros: Inmunización activa frente al virus del moquillo, adenovirus canino tipo 2, parvovirus canino, rabia y las leptospirosis caninas causadas por *Leptospira interrogans* serovariedades *canicola* e *icterohaemorrhagiae*.

• La duración de la inmunidad conferida por la pauta vacunal propuesta es de 1 año.

Inicio de inmunidad: 2 semanas después de la vacunación para el moquillo, adenovirus, parvovirus. 3 semanas para la rabia y 4 semanas para las leptospirosis.

Efectos secundarios

- La presencia de hidróxido de aluminio puede algunas veces provocar la aparición de un pequeño nódulo transitorio en el punto de inyección.
- Como cualquier vacuna, excepcionalmente la vacunación puede poner de manifiesto un estado de hipersensibilidad. Instaurar entonces un tratamiento sintomático.

Vía de administración

Subcutánea o intramuscular.

- La vacuna se dispone para su utilización, disolviendo la valencia liofilizada Trivirovax con la valencia líquida Leptorabisin.

Posología

Perros: 1 dosis (1 ml)/perro, a partir de los 3 meses de edad, cualquiera que sea su raza, edad o peso.

Revacunaciones: Anuales.

Precauciones especiales

- Utilizar la vacuna inmediatamente después de la reconstitución del liofilizado con el diluyente.
- Vacunar animales en perfecto estado de salud y correctamente desparasitados.
- Respetar las condiciones habituales de asepsia.
- Utilizar para la inyección material estéril, desprovisto de cualquier traza de antiséptico.
- Se recomienda no someter al perro a esfuerzos físicos importantes durante el periodo de instauración de la inmunidad.

Modo de conservación

- Conservación entre 2 y 8 °C, en la oscuridad.
- No congelar.

Observaciones

Con prescripción veterinaria.

Presentación

Caja con 10 viales de 1 dosis de liofilizado y 10 viales de 1 dosis de disolvente.

Reg. Nº

9143 IMP