

# **EURICAN<sup>®</sup> MHPPI<sub>2</sub>-L**

**Vacuna viva liofilizada del moquillo, de las adenovirosis, de la parvovirus y de las afecciones respiratorias por la parainfluenza de tipo 2 e inactivada de las leptospirosis por *Leptospira canicola* y *Leptospira icterohaemorrhagiae* del perro**

## **Laboratorio**

---

MERIAL LABORATORIOS, S.A.

## **Forma farmacéutica**

---

Liofilizado y disolvente para suspensión inyectable (Liof.dis.susp.i.)

## **Composición por dosis (1 ml):**

---

*Liofilizado:* Virus del moquillo atenuado como mínimo  $10^{4.0}$  DICC<sub>50</sub>; adenovirus canino (CAV2) atenuado, como mínimo  $10^{2.5}$  DICC<sub>50</sub>; parvovirus canino atenuado, como mínimo  $10^{4.9}$  DICC<sub>50</sub>; virus de la parainfluenza tipo 2 atenuado, como mínimo  $10^{4.7}$  DICC<sub>50</sub>.

*Diluyente:* *Leptospira canicola*, *Leptospira icterohaemorrhagiae* inactivadas, cantidad suficiente para la protección según la Farmacopea Europea.

## **Propiedades farmacológicas**

---

La vacuna induce un estado inmunitario contra el virus del moquillo, de las adenovirosis, de la parvovirus y de las afecciones respiratorias por parainfluenza de tipo 2 del perro y la leptospirosis por *Leptospira canicola* y *Leptospira icterohaemorrhagiae* del perro, demostrado por desafío virulento y por presencia de anticuerpos seroneutralizantes aglutinantes o Elisa.

## **Indicaciones y especies de destino**

---

**Perro:** Inmunización activa contra el moquillo, las adenovirosis, la parvovirus, las afecciones respiratorias por parainfluenza de tipo 2 y las leptospirosis por *Leptospira canicola* e *icterohaemorrhagiae*.

## **Efectos secundarios**

---

La vacunación puede desencadenar reacciones de hipersensibilidad. Entonces hay que instaurar un tratamiento sintomático.

## Vía de administración

---

Subcutánea.

## Posología

---

Una dosis de 1 ml según la pauta de vacunación siguiente:

*Primovacunación:*

- 1ª inyección: a partir de la 7ª semana de edad.
- 2ª inyección: 3 a 5 semanas después, a partir de las 12 semanas de edad.

*Recuerdos:* Anuales.

- Para protección frente a leptospirosis, en caso de riesgo, se recomienda un recuerdo semestral.

## Precauciones especiales

---

- Utilizar la vacuna inmediatamente después de la reconstitución del liofilizado con el diluyente.
- Utilizar para la inyección, material estéril y desprovisto de cualquier traza de antiséptico y/o desinfectante.
- Vacunar únicamente los animales en perfecto estado de salud y correctamente desparasitados, al menos 10 días antes de la vacunación.
- Se recomienda no someter al animal a esfuerzos físicos importantes durante el periodo de instauración de la inmunidad.
- Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las normativas legales.
- Los estudios disponibles no indican efectos desfavorables para las hembras gestantes o lactantes.

## Modo de conservación

---

Conservar entre 2 y 8 °C, al abrigo de la luz. No congelar.

## Observaciones

---

Con prescripción veterinaria.

## Presentación

---

Caja de 10 dosis.

## Reg. Nº

---

1380 SP