

EURICAN[®] PNEUMO

Vacuna bivalente inactivada contra las enfermedades respiratorias del perro causadas por *Bordetella bronchiseptica* y parainfluenza tipo 2, en suspensión inyectable

Laboratorio

MERIAL LABORATORIOS, S.A.

Forma farmacéutica

Suspensión inyectable (Susp.i.)

Composición por dosis:

Bordetella bronchiseptica inactivada 10⁹ gérmenes; virus inactivado de la parainfluenza canina mínimo 32 UHA; excipiente, con hidróxido de aluminio (0,60 mg), c.s.

Propiedades farmacológicas

La vacuna induce la inmunidad activa frente a las afecciones respiratorias causadas por *Bordetella bronchiseptica* y parainfluenza de tipo 2 del perro, demostrado por la presencia de anticuerpos seroneutralizantes.

Interacciones e incompatibilidades

No mezclar con ninguna otra vacuna o producto inmunológico.

Indicaciones y especies de destino

Perros: Inmunización activa contra las afecciones respiratorias causadas por *Bordetella bronchiseptica* y parainfluenza de tipo 2.

Inicio de la inmunidad: 2 semanas después de la primovacunación.

Duración de la inmunidad: El título de anticuerpos aumenta rápidamente, alcanza su nivel máximo 3 meses después de la primovacunación y persiste hasta 1 año.

- Vacunación contra las afecciones respiratorias del perro causadas por *Bordetella bronchiseptica* y el virus parainfluenza tipo II (tos de las perreras).

Efectos secundarios

- La presencia de hidróxido de aluminio puede algunas veces provocar la aparición de un pequeño nódulo transitorio en el punto de inyección, que desaparece en 1 o 2 semanas.
- Excepcionalmente la vacunación puede poner de manifiesto un estado de hipersensibilidad. Instaurar entonces un tratamiento sintomático.

Vía de administración

Subcutánea.

Posología

Perros: 1 dosis (1 ml)/perro, cualquiera que sea su raza, edad o peso.

Primovacación: 2 inyecciones, con 2 a 3 semanas de intervalo.

- Cachorros de madres no vacunadas: Vacunar a partir de la 4ª semana de edad.
- Cachorros de madres vacunadas: Vacunar a partir de la 6ª semana de edad.

Revacunaciones: Anuales o una inyección una semana antes del contacto con una colectividad canina.

Precauciones especiales

- Sólo vacunar animales en perfecto estado de salud y correctamente desparasitados.
- Utilizar para la inyección, material estéril sin ninguna traza de antiséptico.
- Respetar las condiciones habituales de asepsia.
- Se recomienda no someter al perro a esfuerzos físicos importantes durante el periodo de instauración de la inmunidad.
- La vacuna puede utilizarse durante la gestación y la lactancia.
- En caso de autoinyección consulte con un médico inmediatamente y muéstrelle el texto del envase o prospecto.
- Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las normativas locales.

Modo de conservación

Conservar entre 2 y 8 °C, protegida de la luz. No congelar.

Observaciones

- Uso veterinario.
- Dispensación con prescripción veterinaria.

Presentación

Caja con 10 viales de 1 dosis.

Reg. N°

8785 IMP