

EURICAN[®] PRIMO

**Vacuna viva atenuada frente a la parvovirus canina
en suspensión inyectable**

Laboratorio

MERIAL LABORATORIOS, S.A.

Forma farmacéutica

Suspensión inyectable (Susp.i.)

Composición:

Parvovirus canino atenuado (cepa Cornell) $\geq 10^{5.5}$ DICC₅₀; excipiente, c.s.p. 1 ml.

Propiedades farmacológicas

Inmunización activa frente a la parvovirus canina, demostrada por desafío virulento y por la presencia de anticuerpos seroneutralizantes.

Indicaciones y especies de destino

Perros: Inmunización activa frente a la parvovirus.

Contraindicaciones

No inyectar por vía intravenosa.

Efectos secundarios

Excepcionalmente, la vacunación puede poner de manifiesto un estado de hipersensibilidad. Instaurar entonces un tratamiento sintomático.

Vía de administración

Subcutánea.

Posología

Perros: 1 ml por perro cualquiera que sea su edad, raza o peso.

Primovacunación: Primera inyección a partir de las 6 semanas de edad. En caso de riesgo epidemiológico, puede repetirse la vacunación con *Eurican® Primo* de 2 a 3 semanas después. Segunda dosis después de las 12 semanas de edad con una vacuna frente al parvovirus clásica monovalente o asociada.

Primer recuerdo: Un año después de la primovacunación con una vacuna frente a parvovirus tradicional monovalente o asociada.

Recuerdos posteriores: Cada 2 años con una vacuna de parvovirus clásica monovalente o asociada. Recuerdos anuales para explotaciones contaminadas.

Precauciones especiales

- Agitar antes de su empleo.
- Vacunar animales en perfecto estado de salud y correctamente desparasitados.
- Respetar las condiciones habituales de asepsia.
- Utilizar para la inyección material estéril, desprovisto de cualquier traza de antiséptico.
- Se recomienda no someter al perro a esfuerzos físicos importantes durante el periodo de instauración de la inmunidad.
- Los estudios realizados en la vacuna *Eurican® Primo* no indican ningún efecto adverso sobre las hembras gestantes.
- Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las normativas locales.

Modo de conservación

Conservar entre 2 y 8 °C, protegida de la luz. No congelar.

Observaciones

- Uso veterinario.
- Dispensación con prescripción veterinaria.

Presentación

Caja de 10 viales de 1 ml.

Reg. Nº

1227 ESP