

EURICAN[®] R

Vacuna inactivada de rabia para perros, vacunas víricas inactivadas para bovinos, felinos, ovinos equinos y mustélidos (huronos y visones) en suspensión inyectable

Laboratorio

MERIAL LABORATORIOS, S.A.

Forma farmacéutica

Suspensión inyectable (Susp.i.)

Composición:

Virus de la rabia cepa G52 inactivado como mínimo 1 UI; hidróxido de aluminio (adyuvantes). Agua para preparaciones inyectables.

Propiedades farmacológicas

La vacuna induce una inmunidad activa frente a la glicoproteína del virus de la rabia, cepa G52 inactivado, demostrado por desafío virulento y por la presencia de anticuerpos seroneutralizantes. Las células utilizadas en la preparación de la vacuna son de línea celular de Hamster (NIL2). Las células NIL2 se obtienen de un cultivo de células de embrión total de hamster, establecido en línea continua.

Interacciones e incompatibilidades

En ausencia de estudios de compatibilidad, este medicamento veterinario no debe mezclarse con otros medicamentos.

Indicaciones y especies de destino

Bovinos, Perros, Equinos, Felinos, Mustélidos (Hurones, Visonos) y Ovinos: Inmunización activa frente a la rabia con el objetivo de prevenir la infección.

La duración de la inmunidad conferida por la pauta vacunal propuesta en las diferentes especies es la siguiente:

- En caballos, bovinos, ovinos y mustélidos: Un año.
- En perros y gatos: Tres años.

Inicio de la inmunidad:

Perros, gatos, caballos y mustélidos: Dos semanas después de la primovacunación.

Bovinos y ovinos: Cuatro semanas después de la primovacunación.

Contraindicaciones

No administrar por vía subcutánea a los équidos.

Efectos secundarios

- Excepcionalmente, la vacunación puede poner de manifiesto un estado de hipersensibilidad. Instaurar entonces un tratamiento sintomático.
- La presencia de hidróxido de aluminio puede inducir ocasionalmente la formación de un nódulo transitorio y pequeño en el punto de inyección.

Vía de administración

Subcutánea o intramuscular.

Posología

Inyectar por vía subcutánea o intramuscular una dosis de 1 ml según las pautas de vacunación siguientes:

Especie		Edad mínima de vacunación	Revacunación
Caninos, felinos, mustélidos		3	Anuales
Equinos	<6 meses	Nacidos de madres vacunadas	1 ^{er} mes después de la 1 ^a inyección; después anualmente
		Nacidos de madres no vacunadas	
	>6 meses	6	Anuales
Bovinos, Ovinos	<9 meses	Nacidos de madres vacunadas	Entre 9 y 12 meses de edad; después anualmente
		Nacidos de madres no vacunadas	
	>9 meses	9	Anuales

Precauciones especiales

Precauciones especiales para su uso en animales:

- Agitar antes de su empleo.
- Vacunar únicamente animales en buen estado de salud y correctamente desparasitados como mínimo 10 días antes de la administración del producto.
- Se recomienda no someter a los animales a esfuerzos físicos importantes durante el periodo de instauración de la inmunidad.
- Utilizar para la inyección material estéril desprovisto de cualquier traza de antiséptico y/o desinfectante.
- Respetar las condiciones habituales de asepsia.
- Puede utilizarse durante la gestación y la lactancia.
- En caso de autoinyección accidental, consulte con un médico inmediatamente y muéstrele el prospecto o la etiqueta.
- Todo medicamento veterinario o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con la normativa vigente.
- No existe información disponible sobre la seguridad y la eficacia del uso de esta vacuna con cualquier otro medicamento veterinario. La decisión sobre el uso de esta vacuna antes o después de la administración de cualquier otro medicamento veterinario se deberá realizar caso por caso.
- No se han descrito otros efectos adversos aparte de los descritos en la sección efectos secundarios después de la administración de dos veces la dosis recomendada de vacuna.

Tiempo de espera

0 días.

Modo de conservación

Conservar en nevera entre 2 y 8 °C. Proteger de la luz.

Observaciones

- Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.
- Administración bajo control o supervisión del veterinario.

Presentación

Caja con 10 viales de vacuna.

Reg. Nº

8537 IMP