

GALLIMUNE[®] 302 ND + IB + EDS

Vacuna inactivada bronquitis infecciosa, enfermedad de Newcastle y síndrome de caída de puesta, en emulsión inyectable

Laboratorio

MERIAL LABORATORIOS, S.A.

Forma farmacéutica

Emulsión inyectable (Emul.i.)

Composición por dosis:

Virus de la enfermedad de Newcastle inactivado, cepa Ulster 2C, mínimo 50 DP₅₀; virus de la bronquitis infecciosa inactivado, cepa Mass 41, mínimo 18 U.IH; virus del síndrome de caída de puesta (EDS76) inactivado, cepa V127, mínimo 180 U.IH; excipiente oleoso, con tiomersal (máximo 30 µg) c.s.p. 0,30 ml.

Propiedades farmacológicas

La vacuna estimula la inmunidad activa de las pollitas reproductoras y ponedoras contra el síndrome de la caída de puesta (EDS) (sin primovacunación), la enfermedad de Newcastle y la bronquitis infecciosa, después de la primovacunación con las vacunas vivas correspondientes a estas enfermedades.

Interacciones e incompatibilidades

No mezclar con ninguna otra vacuna o producto inmunológico.

Indicaciones y especies de destino

Aves: Bronquitis infecciosa, enfermedad de Newcastle y síndrome de caída de puesta.

- Inmunización de recuerdo de las pollitas reproductoras y ponedoras después de vacunación con las vacunas vivas contra:

- El virus de la enfermedad de Newcastle, a fin de reducir la caída de puesta ligada a la infección causada por la enfermedad de Newcastle.

- El virus de la bronquitis infecciosa, a fin de reducir la caída de puesta ligada a la infección causada por la bronquitis infecciosa, cepa Mass 41.

- Inmunización activa de las pollitas reproductoras y ponedoras a fin de reducir la caída de puesta ligada a la infección causada por el virus del síndrome de caída de puesta EDS76, sin primovacunación.

Inicio de la inmunidad: 4 semanas después de la vacunación.

Duración de la inmunidad: Un periodo de puesta.

Efectos secundarios

- No se observaron reacciones palpables después de inyección de una dosis de vacuna.
- En estudios clínicos, se observaron histológicamente lesiones ligadas al adyuvante oleoso tres semanas después de la inyección en el 87% de los casos, por ejemplo pequeñas cantidades de residuos oleosos y ocasionales microabscesos asépticos.

Vía de administración

Intramuscular.

- Agítese bien antes de su uso.
- No utilice jeringas con émbolos elastómeros de butilo o caucho natural.
- El material, incluyendo agujas y jeringas debe ser esterilizado antes de usar.

Posología

Aves: 1 dosis (0,3 ml) por vía intramuscular a partir de la edad de 18 semanas y como mínimo 4 semanas después de la primovacunación con las vacunas vivas contra la enfermedad de Newcastle (cepa Hitchner B1 o VG/GA) y la bronquitis infecciosa (cepa Mass H120) y antes del inicio de la puesta.

Precauciones especiales

- Vacúnese solamente a los animales sanos.
- No utilizar en las dos semanas anteriores al inicio de la puesta ni durante el periodo de puesta.
- Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo, deberán eliminarse de conformidad con las normativas locales.
- La inyección accidental es peligrosa. Lea el prospecto antes de usar.

Tiempo de espera

0 días.

Modo de conservación

Conservar y transportar refrigerado entre 2 y 8 °C, protegido de la luz. No congelar.

Observaciones

Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

Presentación

Envases con 1000 y 10 × 1000 dosis.

Reg. N°

1590 ESP