

# **GALLIMUNE® 407 ND + IB + EDS + ART**

**Vacuna inactivada bronquitis infecciosa, enfermedad de Newcastle, síndrome de caída de puesta y síndrome de cabeza hinchada, en emulsión inyectable**

## **Laboratorio**

---

MERIAL LABORATORIOS, S.A.

## **Forma farmacéutica**

---

Emulsión inyectable (Emul.i.)

## **Composición por dosis:**

---

Virus de la enfermedad de Newcastle inactivado, cepa Ulster 2C, mínimo 50 DP<sub>50</sub>; virus de la bronquitis infecciosa inactivado, cepa Mass 41, mínimo 18 U.IH; virus del síndrome de caída de puesta (EDS76) inactivado, cepa V127, mínimo 180 U.IH; virus de la rinotraqueítis aviar (síndrome de cabeza hinchada) inactivado, cepa VCO3, mínimo 60 U.PI; excipiente oleoso, con tiomersal (máximo 30 µg) c.s.p. 0,30 ml.

## **Propiedades farmacológicas**

---

La vacuna estimula la inmunidad activa de las pollitas reproductoras y ponedoras contra el síndrome de caída de puesta (EDS76) (sin primovacunación), la enfermedad de Newcastle, la bronquitis infecciosa y la rinotraqueítis aviar (síndrome de la caída de puesta), después de primovacunación con las vacunas vivas, correspondientes a estas enfermedades.

## **Interacciones e incompatibilidades**

---

No mezclar con ninguna otra vacuna o producto inmunológico.

## Indicaciones y especies de destino

---

**Aves:** Bronquitis infecciosa, enfermedad de Newcastle, síndrome de caída de puesta y síndrome de cabeza hinchada.

- Inmunización de recuerdo de las pollitas reproductoras y ponedoras después de vacunación con las vacunas vivas contra:

- El virus de la enfermedad de Newcastle, a fin de reducir la caída de puesta ligada a la infección causada por la enfermedad de Newcastle.

- El virus de la bronquitis infecciosa, a fin de reducir la caída de puesta ligada a la infección causada por la bronquitis infecciosa, cepa Mass 41.

- El neumovirus aviar, a fin de reducir los signos respiratorios ligados a la infección causada por el neumovirus aviar (rinotraqueítis aviar).

- Inmunización activa de las pollitas reproductoras y ponedoras a fin de reducir la caída de puesta ligada a la infección causada por el virus del síndrome de caída de puesta EDS76, sin primovacunación.

- Para las valencias enfermedad de Newcastle, bronquitis infecciosa y síndrome de caída de puesta: *Inicio de la inmunidad:* Cuatro semanas después de la vacunación.

*Duración de la inmunidad:* Un periodo de puesta.

- Para la valencia rinotraqueítis aviar:

La inmunidad ha sido demostrada mediante desafío 14 semanas después de la vacunación y persiste hasta el final del periodo de puesta.

## Efectos secundarios

---

- No se observaron reacciones palpables después de inyección de una dosis de vacuna.

- En estudios clínicos, se observaron histológicamente lesiones ligadas al adyuvante oleoso tres semanas después de la inyección en el 87% de los casos, por ejemplo pequeñas cantidades de residuos oleosos y ocasionales microabscesos asépticos.

## Vía de administración

---

Intramuscular.

- Agítese bien antes de su uso.

- No utilice jeringas con émbolos elastómeros de butilo o caucho natural.

- El material, incluyendo aguas y jeringas, debe ser esterilizado antes de usar.

## Posología

---

**Aves:** 1 dosis (0,3 ml) por vía intramuscular a partir de la edad de 18 semanas y como mínimo 4 semanas después de la primovacunación con las vacunas vivas contra la enfermedad de Newcastle (cepa Hitchner B1 o VG/GA) la bronquitis infecciosa (cepa Mass H120) y el neumovirus aviar (cepa PL21) y antes del inicio de la puesta.

## **Precauciones especiales**

---

- Vacúnese solamente a los animales sanos.
- No utilizar en las dos semanas anteriores al inicio de la puesta ni durante el periodo de puesta.
- Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo, deberán eliminarse de conformidad con las normativas locales.
- La inyección accidental es peligrosa. Lea el prospecto antes de usar.

## **Tiempo de espera**

---

0 días.

## **Modo de conservación**

---

Conservar y transportar refrigerado entre 2 y 8 °C, protegido de la luz. No congelar.

## **Observaciones**

---

Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

## **Presentación**

---

Envases con 1000 y 10 × 1000 dosis.

## **Reg. Nº**

---

1592 ESP