

# **IBRAXION®**

## **Vacuna inactivada marcadora (gE<sup>-</sup>) frente al IBR en emulsión inyectable**

### **Laboratorio**

---

MERIAL LABORATORIOS, S.A.

### **Forma farmacéutica**

---

Emulsión inyectable (Emul.i.)

### **Composición por dosis (2 ml):**

---

Cada dosis de 2 ml contiene:

Virus IBR con delección gE inactivado, al menos 0,75 U.VN\*; aceite ligero de parafina 449,6-488,2 mg.

\*U.VN: Título de anticuerpos vironeutralizantes obtenido después de la inyección de la vacuna en el cobayo.

### **Propiedades farmacológicas**

---

Inmunización activa de los bovinos a fin de reducir los signos clínicos de la rinotraqueítis infecciosa bovina (IBR) y la excreción de virus campo.

### **Interacciones e incompatibilidades**

---

En ausencia de datos sobre la eficacia y seguridad de la administración simultánea de esta vacuna con otras, se recomienda no administrar otros productos simultáneamente.

### **Indicaciones y especies de destino**

---

**Bovinos:** Rinotraqueítis infecciosa bovina (IBR).

### **Contraindicaciones**

---

Ninguna.

## Efectos secundarios

---

- La inyección de la vacuna puede provocar en el punto de inyección una reacción tisular transitoria que puede persistir durante tres semanas, pero que raramente sobrepasa las cinco semanas.
- Se puede observar un ligero aumento (<1 °C) y transitorio (menos de 48 horas después de la inyección) de la temperatura rectal sin ninguna consecuencia en la salud y los resultados económicos del animal.
- Si excepcionalmente apareciera una reacción de hipersensibilidad, como puede suceder con cualquier vacunación, deberá instaurarse un tratamiento sintomático apropiado. Aparte de los efectos observados y descritos, no se observó ningún otro efecto después de la administración de una sobredosis.

## Vía de administración

---

Subcutánea.

## Posología

---

Agitar el frasco antes de su uso.

Inyectar en el cuello delante del hombro.

Inyectar una dosis de 2 ml por vía subcutánea según la pauta de vacunación siguiente:

*Primovacunación:* Dos inyecciones con 21 días de intervalo. Utilizar a partir de las 2 semanas en animales con ausencia de anticuerpos maternos contra el virus de la rinotraqueítis infecciosa bovina o a partir de los 3 meses en animales con presencia de anticuerpos maternos.

*Recuerdo:* Una inyección cada 6 meses.

- *Ibraxion*<sup>®</sup> puede ser utilizado en vacas gestantes y en vacas en lactación.

## Precauciones especiales

---

- Vacunar solamente a los animales en buen estado de salud.
- La vacuna debe ser utilizada a una temperatura de entre 15 y 25 °C.
- Utilizar jeringas y agujas estériles.

## Tiempo de espera

---

0 días.

## Modo de conservación

---

- Conservar entre 2 y 8 °C, protegido de la luz.
- No congelar.
- Periodo de validez: 18 meses. 6 horas después de la apertura del frasco.

## Observaciones

---

Con prescripción veterinaria.

## **Presentación**

---

Caja de 1 frasco de 10 dosis.

## **Reg. Nº**

---

EU/2/99/017/001-006