

IVOMEC® INYECTABLE OVINOS

Antiparasitario endectocida
en solución inyectable

Laboratorio

MERIAL LABORATORIOS, S.A.

Forma farmacéutica

Solución inyectable (Sol.i.)

Composición:

Ivermectina 1%.

Propiedades farmacológicas

Antiparasitario, en forma de solución inyectable, eficaz en el tratamiento y control de los siguientes parásitos que afectan al ganado ovino:

- Vermes redondos gastrointestinales (adultos, L3 y L4): *Haemonchus contortus*, *Ostertagia circumcincta* y *O. trifurcata*, *Trichostrongylus axei*, *T. colubriformis* y *T. vitrinus*, *Nematodirus filicollis*, *Cooperia curticei*, *Oesophagostomum columbianum* y *O. venulosum*, *Chabertia ovina*, *Trichuris ovis*.
- Vermes pulmonares (adultos e inmaduros): *Dictyocaulus filaria*, *Protostrongylus rufescens*.
- Reznos nasales (estros) (todos los estadios larvarios): *Oestrus ovis*.
- Ácaros: *Sarcoptes scabiei*, *Psoroptes communis ovis*.

Indicaciones y especies de destino

Ovino: Nematodosis gastrointestinal, nematodosis pulmonar, oestrosis, sarna y otras parasitosis externas.

Tratamiento efectivo de vermes redondos gastrointestinales y pulmonares, larvas nasales de *Oestrus ovis* y ácaros de la sarna.

Vía de administración

Subcutánea, exclusivamente.

- No debe aplicarse por vía intramuscular o intravenosa. Se recomienda especialmente que los animales estén vacunados frente a infecciones por clostridios.

Posología

Ovino: 0,5 ml/25 kg p.v. (200 µg ivermectina/kg p.v.).

- Una sola inyección puede reducir marcadamente el número de *Psoroptes communis ovis*, y frecuentemente resuelve los signos clínicos de sarna. Se requieren 2 inyecciones, con un intervalo de 7 días, para controlar todos los ácaros vivos.
- Puede ser usado en animales reproductores.

Tiempo de espera

Carne: 21 días.

Leche: No usar.

Modo de conservación

Guardar el frasco en la caja para protegerlo de la luz.

Observaciones

Con prescripción veterinaria.

Presentación

Envases con 50, 200 y 500 ml.

Reg. N°

0076 ESP