

IVOME[®]C INYECTABLE PORCINOS

Antiparasitario endectocida
en solución inyectable

Laboratorio

MERIAL LABORATORIOS, S.A.

Forma farmacéutica

Solución inyectable (Sol.i.)

Composición:

Ivermectina 1%.

Propiedades farmacológicas

Antiparasitario, en forma de solución inyectable, eficaz en el tratamiento y control de los siguientes parásitos que afectan al ganado porcino:

- Vermes redondos gastrointestinales: *Ascaris suum* (adultos y L4), *Hyostrongylus rubidus* (adultos y L4), *Oesophagostomum* spp. (adultos y L4), *Strongyloides ransomi* (adultos)*, *Trichuris suis* (adultos)**.
- Vermes renales: *Stephanurus dentatus* (adultos y L4).
- Vermes pulmonares: *Metastrongylus* spp. (adultos).
- Piojos: *Haematopinus suis*.
- Ácaros de la sarna: *Sarcoptes scabiei* var. *suis*.

*Ivomec[®] administrado a la cerda 7 a 14 días antes del parto controla con eficacia la transmisión, a través de la leche, de las infestaciones con *Strongyloides ransomi* a los lechones.

**En estudios de eficacia, Ivomec[®] fue 80% efectivo contra *Trichuris suis* (adultos).

Interacciones e incompatibilidades

No se han descrito.

Indicaciones y especies de destino

Cerdos: Nematodosis gastrointestinal, nematodosis pulmonar, sarna y parasitosis externas.

- Tratamiento y control de parásitos internos y externos del ganado porcino.

Efectos secundarios

Como efectos secundarios pueden presentarse, en algunos casos, signos clínicos de dolor y/o reacción inflamatoria en el punto de inyección.

Vía de administración

Subcutánea.

Posología

Cerdos: 0,30 ml/10 kg p.v. (300 µg de ivermectina/kg p.v.), en dosis única.

Tiempo de espera

Carne: 28 días.

Modo de conservación

Guardar el frasco dentro del envase para protegerlo de la luz.

Observaciones

Con prescripción veterinaria.

Presentación

Envase con 50 ml.
Envase con 200 ml.
Envase con 500 ml.

Reg. Nº

0045 ESP