

NEOCOLIPOR

Vacuna inactivada contra la colibacilosis porcina en suspensión inyectable

Laboratorio

MERIAL LABORATORIOS, S.A.

Forma farmacéutica

Suspensión inyectable (Susp.i.)

Composición por dosis:

Adhesinas: F4(K88ab, K88ac, K88ad), mínimo 2,1 U.SA*. F5(K99), mínimo 1,7 U.SA. F6(987P), mínimo 1,4 U.SA. F41, mínimo 1,7 U.SA. Aluminio (en forma de hidróxido), 1,4 mg. Excipiente y diluyente, c.s.p.

* 1 U.SA: Cantidad de antígeno suficiente para obtener títulos de anticuerpos seroaglutinantes de 1 log10 en el cobaya.

Propiedades farmacológicas

Características generales: Vacuna inactivada contra la colibacilosis del cerdo.

Características inmunitarias: Contiene cepas inactivadas de *Escherichia coli* con expresión de las adhesinas F4ab, F4ac, F4ad, F5, F6, F41, responsables de enterotoxiosis neonatales en los lechones.

Interacciones e incompatibilidades

No se han descrito.

Indicaciones y especies de destino

Porcino: Vacuna adyuvada inactivada para la reducción de las enterotoxiosis neonatales de los lechones causadas por cepas de *E. coli* que expresan las adhesinas F4ab, F4ac, F4ad, F5, F6 y F41.

Contraindicaciones

Ninguna.

Efectos secundarios

No se han descrito.

Vía de administración

Intramuscular, en la zona del cuello, caudal a la oreja.

Posología

Primovacunación: Primera inyección: 5 a 7 semanas antes del parto. Segunda inyección: 2 semanas antes del parto.

Revacunación: Una dosis, 2 semanas antes de cada parto.

- Dado que la inmunización de los lechones proviene del calostro, debe asegurarse un consumo suficiente del mismo, dentro de las 6 horas posteriores al parto.

Precauciones especiales

- Vacunar únicamente animales sanos y evitando situaciones de estrés.
- Respetar las condiciones habituales de asepsia.
- No administrar junto con otros productos farmacológicos.
- Agitar enérgicamente el frasco antes de su empleo.
- Utilizar ininterrumpidamente una vez iniciada la extracción del contenido.
- Duración del vial una vez abierto: 3 horas.
- En caso de autoinyección accidental, se recomienda consultar a un médico.
- Lavarse y desinfectarse las manos después de su uso.
- Seguir los requisitos de las autoridades locales al eliminar los restos del medicamento.

Tiempo de espera

No precisa.

Modo de conservación

- Conservar entre 2 y 8 °C, al abrigo de la luz.
- No congelar.

Observaciones

Con prescripción veterinaria.

Presentación

Frasco con 50 ml (25 dosis).

Reg. Nº

EU/2/98/008/003