

ORAMEC

Antiparasitario endectocida en solución oral

Laboratorio

MERIAL LABORATORIOS, S.A.

Forma farmacéutica

Solución oral (Sol.o.)

Composición:

Ivermectina 0,08%.

Propiedades farmacológicas

Antiparasitario, en forma de solución oral, eficaz en el tratamiento de los siguientes parásitos que afectan a las ovejas:

- Vermes redondos gastrointestinales: *Haemonchus contortus* y *H. placei*, *Ostertagia circumcincta*, *Trichostrongylus axei*, *T. colubriformis* y *T. vitrinus*, *Cooperia curticei* y *C. oncophora*, *Gaigeria pachyscelis*, *Nematodirus battus*, *N. filicollis* y *N. spathiger*, *Strongyloides papillosus*, *Chabertia ovina*, *Trichuris ovis*, *Oesophagostomum columbianum* y *O. venulosum*.

- Vermes pulmonares: *Dictyocaulus filaria*.

- Reznos nasales: *Oestrus ovis* (todos los estadios larvarios).

- Ácaros de la sarna: *Psorergates ovis*.

Asimismo, eficaz frente a los siguientes parásitos que afectan a las cabras:

- Vermes redondos gastrointestinales: *Haemonchus contortus*, *Ostertagia circumcincta*, *Trichostrongylus colubriformis*, *Nematodirus spathiger*, *Strongyloides papillosus*, *Oesophagostomum columbianum* y adultos de *Chabertia ovina*.

- Vermes pulmonares: *Dictyocaulus filaria* (adultos).

Indicaciones y especies de destino

Ovino: Nematodosis gastrointestinal, nematodosis pulmonar y estrosis.

Caprino: Tratamiento y prevención de nematodos gastrointestinales y pulmonares.

Vía de administración

Oral.

- No usar por vía parenteral.

Posología

Ovino/Caprino: 2,50 ml/10 kg p.v. (200 µg de ivermectina/kg p.v.), en dosis única.

- No se conocen los efectos sobre la reproducción en cabras. Sin embargo, estudios hechos en ovejas no evidencian efectos negativos sobre la reproducción.

Tiempo de espera

Carne:

- Ovino: 6 días.

- Caprino: 8 días.

Modo de conservación

No almacenar por encima de 25 °C.

Observaciones

Con prescripción veterinaria.

Presentación

Envases con 1 y 5 litros.

Reg. N°

1041 ESP