

PASTOBOV

Vacuna inactivada contra las infecciones de los bóvidos producidas por *Mannheimia haemolytica* con leucotoxina en suspensión inyectable

Laboratorio

MERIAL LABORATORIOS, S.A.

Forma farmacéutica

Suspensión inyectable (Susp.i.)

Composición por dosis (2 ml):

Antígeno de *Mannheimia haemolytica*: Leucotoxina (título mínimo 68 U. ELISA); excipiente con hidróxido de aluminio y tiomersal c.s.p. 1 dosis.

Propiedades farmacológicas

Vacuna adyuvada, inactivada contra las infecciones respiratorias de los bóvidos producidas por *Mannheimia haemolytica*. La vacuna induce una respuesta inmune contra *Mannheimia haemolytica* que ha sido demostrada por desafío, y por la presencia de anticuerpos contra los antígenos capsulares y la leucotoxina de *Mannheimia haemolytica*.

De la vacunación de recuerdo resulta una respuesta anamnésica de anticuerpos contra los antígenos capsular y leucotoxina de *Mannheimia haemolytica*.

Interacciones e incompatibilidades

En ausencia de estudios de compatibilidad, este medicamento de uso veterinario no debe mezclarse con ningún otro medicamento de uso veterinario.

Indicaciones y especies de destino

Inmunización activa de los bovinos para reducir los signos clínicos y las lesiones de la enfermedad respiratoria inducida por *Mannheimia haemolytica* A1.

Contraindicaciones

Ninguna.

Efectos secundarios

- La vacunación por vía subcutánea va seguida de una reacción local limitada a 2-5 cm que remite al cabo de tres semanas.
- La vacunación por vía intramuscular puede dar lugar a un edema difuso transitorio y a una ligera reacción local de hasta 5 cm de diámetro que remite en 1-2 semanas.
- Después de la inyección subcutánea e intramuscular pueden aparecer granulomas de hasta 5 cm de diámetro.
- La vacunación (por vía subcutánea o intramuscular) puede inducir algunas veces una ligera (1 °C) transitoria (24-72 horas), hipertermia y también reacciones de hipersensibilidad.

Vía de administración

- Intramuscular o subcutánea.
- Agítese antes de usar.
- Usar ininterrumpidamente una vez iniciada la extracción del contenido.

Posología

Vía intramuscular o subcutánea.

Inyectar una dosis de 2 ml según la pauta de vacunación siguiente:

Primovacunación: Preferentemente antes del periodo de riesgo.

- 1ª inyección a la edad mínima de cuatro semanas.

- 2ª inyección, 21-28 días después.

Recuerdo de vacunación: Preferentemente antes de cada periodo de riesgo.

Una inyección no más tarde de un año después de la vacunación anterior.

Precauciones especiales

- Agitar bien antes de su uso.
- Vacunar únicamente a animales sanos.
- Respetar las condiciones habituales de asepsia.
- Puede ser utilizado durante la gestación.
- En caso de autoinyección accidental, consulte con un médico inmediatamente y muéstrelle el texto del prospecto o de la etiqueta.
- Todo frasco empezado debe ser utilizado en el mismo día de trabajo.
- Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las normativas locales.

Tiempo de espera

0 días.

Modo de conservación

Conservar y transportar entre 2 y 8 °C protegido de la luz. No congelar.

Observaciones

Sujeto a prescripción veterinaria.

Presentación

Frasco de 20 ml (10 dosis).

Reg. N°

1174 ESP