

RHINIFFA T

Vacuna inactivada frente a la rinitis atrófica en suspensión inyectable

Laboratorio

MERIAL LABORATORIOS, S.A.

Forma farmacéutica

Suspensión inyectable (Susp.i.)

Composición por dosis (2 ml):

Bordetella bronchiseptica (cepa toxigénica), $\geq 0,9$ U.SA.*

Pasteurella multocida tipo D (cepa toxigénica), $\geq 0,9$ U.ELISA.**

Anatoxina de *Pasteurella multocida*, $\geq 1,0$ U.ELISA.

Hidróxido de aluminio (expresado en Al^{3+}), 1,4 mg.

Tiomersal, 0,2 mg.

Excipiente, c.s.p. una dosis.

*U.SA: c.s. para obtener en el animal de laboratorio títulos de anticuerpos seroaglutinantes de $1 \log_{10}$ después de la administración de la vacuna.

**U. ELISA: c.s. para obtener en el animal de laboratorio títulos de $1 \log_{10}$ por el método ELISA después de la administración de la vacuna.

Propiedades farmacológicas

Vacuna inactivada adyuvada frente a la rinitis atrófica del cerdo. La vacuna induce un estado inmunitario contra los gérmenes responsables de la rinitis atrófica, demostrado por desafío virulento.

Interacciones e incompatibilidades

No se han descrito.

Indicaciones y especies de destino

Cerdas jóvenes y Cerdas gestantes: Inmunización pasiva de los lechones contra la rinitis atrófica, por administración de la vacuna a la madre gestante.

Contraindicaciones

Ninguna.

Efectos secundarios

La vacunación, al igual que cualquier inyección de cuerpos bacterianos es susceptible de poner de manifiesto un estado de hipersensibilidad. Debe instaurarse entonces un tratamiento sintomático.

Vía de administración

Intramuscular profunda en los músculos del cuello.

Posología

Inyectar una dosis de 2 ml según la pauta de vacunación siguiente:

Cerdas jóvenes y Cerdas gestantes:

*Primovacuna*ión: Dos inyecciones, con 4 a 6 semanas de intervalo, aplicando la segunda inyección 15 días antes de la fecha prevista del parto.

Revacunación: Una inyección 15 días antes de la fecha prevista del parto.

- Agitar el frasco antes de usar.
- Usar ininterrumpidamente una vez iniciada la extracción del contenido.

Precauciones especiales

- Respetar las normas habituales de asepsia.
- Vacunar únicamente los animales en buen estado de salud.
- Los lechones quedan protegidos mediante la toma de calostro. Por lo tanto, hay que asegurarse tras el parto de que cada lechón consume rápidamente una cantidad suficiente de calostro.
- No se ha constatado ningún efecto indeseable después de la administración de una doble dosis de vacuna.
- Vacunar exclusivamente a las madres gestantes.

Tiempo de espera

0 días.

Modo de conservación

Conservar entre 2 y 8 °C, protegida de la luz.

Observaciones

Con prescripción veterinaria.

Presentación

Frasco con 50 ml (25 dosis).

Reg. N°

1205 ESP