

STOMORGYL 10 kg

Antibacteriano de amplio espectro compuesto por
espiramicina y metronidazol
en comprimido oral

Laboratorio

MERIAL LABORATORIOS, S.A.

Forma farmacéutica

Comprimido oral (Comp.o.)

Composición por comprimido:

Espiramicina 750000 UI, metronidazol 125 mg, excipiente c.s.p. 600 mg.

Propiedades farmacológicas

Stomorgyl 10 kg asocia de forma complementaria y/o sinérgica dos antiinfecciosos que difunden preferentemente en todos los tejidos de la cavidad bucodental: encías, saliva, fluido gingival, hueso alveolar, glándulas salivares.

La espiramicina, perteneciente a la familia de los macrólidos, es activa frente a los gérmenes Gram (+) (aerobios y anaerobios).

El metronidazol, antiinfeccioso de la serie de los nitroimidazoles es activo frente a la mayoría de los gérmenes anaerobios estrictos y sobre ciertos protozoos (*Giardia*, *Entamoeba*). El espectro de acción de Stomorgyl 10 kg es pues muy amplio y comprende la mayoría de los gérmenes bucodentales considerados como patógenos: *Bacteroides*, *Fusobacterium*, *Actinomyces*, *Streptococcus* y espiroquetas.

Interacciones e incompatibilidades

No usar conjuntamente con cloranfenicol y/o lincosamidas.

Indicaciones y especies de destino

Stomorgyl 10 kg está indicado en el perro y el gato con fines terapéuticos para el tratamiento de las afecciones bucales:

- Enfermedad periodontal, estomatitis, gingivitis, glositis, piorrea, halitosis (mal aliento) y de las afecciones faríngeas: infecciones de las glándulas salivares, amigdalitis, faringitis, producidas por gérmenes sensible aerobios y anaerobios.

Contraindicaciones

No administrar a hembras gestantes.

Efectos secundarios

- En casos esporádicos, pueden presentarse signos de intolerancia que suelen manifestarse con anorexia y vómitos.
- Puede producir una coloración amarillo pardusca de la orina.

Vía de administración

Oral.

Posología

- Perros y Gatos:** 1 comprimido Stomorgyl 10/10 kg p.v./día.
- Tratar durante 5 a 10 días.

Precauciones especiales

No se requieren.

Tiempo de espera

Sin objeto.

Modo de conservación

Conservar a temperatura menor de 25 ± 2 °C.

Observaciones

Con prescripción veterinaria.

Presentación

Caja con 2 blísteres de 10 comprimidos cada uno.

Reg. N°

0537 ESP