

# **TUR-3**

## **Vacuna inactivada Newcastle, paramixovirus y rinitis infecciosa del pavo en suspensión inyectable**

### **Laboratorio**

---

MERIAL LABORATORIOS, S.A.

### **Forma farmacéutica**

---

Suspensión inyectable (Susp.i.)

### **Composición por dosis:**

---

Virus inactivado Newcastle mínimo  $10^8$   $DIE_{50}$ ; virus inactivado paramixovirus 3 mínimo  $10^{6.7}$   $DIE_{50}$ ; virus inactivado de la rinitis infecciosa del pavo mínimo  $10^5$   $DICT_{50}$ ; excipiente oleoso, con mertiolato (máximo 15  $\mu$ g), c.s.p. 0,30 ml.

### **Propiedades farmacológicas**

---

La vacuna induce en el animal vacunado una seroconversión específica durante todo el periodo de puesta y una protección específica al menos en el momento del pico de puesta.

### **Indicaciones y especies de destino**

---

**Pavos:** Enfermedad de Newcastle, paramixovirus 3 y rinitis infecciosa.

- Inmunización activa de pavas y pavos, futuros reproductores, como revacunación después de la administración de las vacunas vivas contra la enfermedad de Newcastle y la rinitis infecciosa.

### **Vía de administración**

---

Subcutánea o intramuscular.

### **Posología**

---

**Pavos:** Dos inyecciones de 0,30 ml/ave, con un intervalo de 6 semanas.

- Primera inyección: 8 a 10 semanas antes del inicio de la puesta.
- Segunda inyección: 2 a 4 semanas antes del inicio de la puesta.

## **Precauciones especiales**

---

- Agitar el frasco antes del empleo.
- Vacunar únicamente los animales en buen estado de salud.
- No utilizar jeringas con émbolo de elastómero a causa del caucho natural o derivados del butilo.

## **Tiempo de espera**

---

0 días.

## **Modo de conservación**

---

Conservar entre 2 y 8 °C, protegida de la luz.

## **Observaciones**

---

Medicamento sujeto a prescripción veterinaria. Administración bajo control o supervisión del veterinario.

## **Presentación**

---

Frasco con 500 dosis.

## **Reg. Nº**

---

9356 IMP