

TUR-3

Vacuna inactivada Newcastle, paramixovirus y rinitis infecciosa del pavo en suspensión inyectable

Laboratorio

MERIAL LABORATORIOS, S.A.

Forma farmacéutica

Suspensión inyectable (Susp.i.)

Composición por dosis:

Virus inactivado Newcastle mínimo 10^8 DIE_{50} ; virus inactivado paramixovirus 3 mínimo $10^{6.7}$ DIE_{50} ; virus inactivado de la rinitis infecciosa del pavo mínimo 10^5 $DICT_{50}$; excipiente oleoso, con mertiolato (máximo 15 μ g), c.s.p. 0,30 ml.

Propiedades farmacológicas

La vacuna induce en el animal vacunado una seroconversión específica durante todo el periodo de puesta y una protección específica al menos en el momento del pico de puesta.

Indicaciones y especies de destino

Pavos: Enfermedad de Newcastle, paramixovirus 3 y rinitis infecciosa.

- Inmunización activa de pavas y pavos, futuros reproductores, como revacunación después de la administración de las vacunas vivas contra la enfermedad de Newcastle y la rinitis infecciosa.

Vía de administración

Subcutánea o intramuscular.

Posología

Pavos: Dos inyecciones de 0,30 ml/ave, con un intervalo de 6 semanas.

- Primera inyección: 8 a 10 semanas antes del inicio de la puesta.
- Segunda inyección: 2 a 4 semanas antes del inicio de la puesta.

Precauciones especiales

- Agitar el frasco antes del empleo.
- Vacunar únicamente los animales en buen estado de salud.
- No utilizar jeringas con émbolo de elastómero a causa del caucho natural o derivados del butilo.

Tiempo de espera

0 días.

Modo de conservación

Conservar entre 2 y 8 °C, protegida de la luz.

Observaciones

Medicamento sujeto a prescripción veterinaria. Administración bajo control o supervisión del veterinario.

Presentación

Frasco con 500 dosis.

Reg. Nº

9356 IMP